

Bibliographie

- SORBI, S. & HUPPERETZ, J. (1993) : Recherches sur les cavités naturelles propices à la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) en Haute-Ardenne . *AVES*, 30 : 81-93.
- SORBI, S. (1995) : La Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*) en Belgique. Synthèse, historique et mise à jour du statut. *AVES*, 32 : 101-132.
- SORBI, S. (1996) : Un cas d'«albinisme partiel chez des pulli de Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). *AVES*, 33 : 58-59.
- SORBI, S (1997): A propos du comportement territorial et pré-nuptial de la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). *AVES*, 34 : 18-19.
- SORBI, S. (1998) : Utilisation du domaine vital par la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). Suivi par radio-pistage : matériel, méthode et premiers résultats. *AVES*, 35 : 149-150.
- SORBI, S. (1998) : L'«avifaune sylvicole évolue-t-elle favorablement ? Une illustration par l'«étude d'un grand cavernicole : la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). Santé et biodiversité en forêt wallonne , acte des colloques, Namur 7 novembre 1997, Gembloux 27-28 novembre 1997. Région Wallonne, DGRNE, Division Nature et Forêts.
- ROBERT, H . & SORBI, S. (2001) : Variation du sexe-ratio au nid chez la Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*). *AVES*, 38 : 69-76.
- SORBI, S. (2003): Etendue et utilisation du domaine vital chez la Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* en Haute Ardenne Belge : suivi par radio-pistage. *Alauda*, 71 : 215-220.